

MASTITİST PROBLEMİ YAŞAMAMAK İÇİN

Süt sığırcılığı için büyük bir problem teşkil eden meme problemlerinden mastitiste hayvanların yakalanmamaları için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye edilir.

Dikkat edilecek hususlar :



- İneğinizi kuruya çıkartırken tamamen memeyi boşalttıktan sonra mastitise karşı önlem için her bir meme içine antibiyotik veriniz
- İneğinin kuru dönem süresinin 45-60 gün civarında olmasına özen gösteriniz
- Doğumdan önce ineğinin memesini her ne surette olursa olsun sağlamayınız
- Sağım birkaç saat önce sütünü bırakan hayvanlarınızı, sağıma kadar temiz bir yerde tutunuz.
- Sürekli mastitise yakalanan ineklerinizi elden çıkartınız
- Sürünüzde diğer ineklerin memelerini emen inekleri elden çıkartınız
- Ahırlarınızın havalandırmasını mutlaka kontrol ediniz
- Ahır kapısı önüne mutlaka bir kireç havuzu koyunuz
- Gezinti alanlarında hayvanların su ve dışkı birikintilerine yatmaması için suni tepelikler inşa ediniz
- Ön sağım yapınız
- İlk önce genç inekleri, daha sonra yaşlı inekleri ve en son olarak mastitis problemi yaşayan ineklerinizi sağınız
- Sütünü bırakmayan ineğinin memesine bir sıcak, bir soğuk su kullanmak suretiyle lavaj yaparak masaj yapınız
- Mastitis tedavisi amacıyla meme içine ve kas içi antibiyotik verilen ineklerinizin sütlerini asgari 3 gün (6 sağım) sağlıklı sütlerle katmayınız.
- Mastitisli sütleri kesinlikle buzağı beslemede kullanmayınız
- Mastitisli sütleri, dezenfektanlı su ile dolu bir kaba koyarak imha ediniz
- Sağımı biten ineklerinizin memelerini püskürtme veya daldırma yöntemi ile dezenfekte ediniz
- Sağımı biten ineğe karma yem vermek suretiyle ayakta kalmasını, böylelikle meme kaslarının kapanması için zaman sağlayınız
- Sağımdan sonra sağım ekipmanlarını önce dezenfekte ediniz
- Sağım makinesi pulsator lastiklerini her üç ayda bir yenileyiniz
- Buzağı döneminde dişi buzağılarda fazla meme başlarını aldırınız
- Buzağılarınıza sütü elden vermeye özen gösteriniz