

BUZAĞILARDA ASKARİDİOZİS

Özellikle buzağı ve danaların ince bağırsaklarında yaşayarak büyük zararlara sebep olurlar. Bu nematoda karşı 6 aydan sonra direnç geliştiğinden erişkinlerde parazite rastlanmamaktadır. Buzağılar Askarit yumurtalarını yem, su, yalama vs ile alabilirler. Buzağılar kolostrum yolu ile de askarit invasyonu olabilmektedir.

Belirtileri:

Az sayıda ki askaritler belirgin bir semptom oluşturmazlar. Çok sayıda olduklarında ise; kan emerek beslendikleri için gelişme geriliği, kaşeksi ve anemiye sebep olurlar. Askaritli genç hayvanların kılları karışık ve mat görünüşte olur, kıl değişimi aksar.

Toksinlerin etkisiyle buzağılarda sinirsel bozukluklara neden olurlar, ayrıca eksitasyon, koma ve arka ayaklarda felç oluşabilir. Buzağının solunum havasında eter, aseton veya sarımsak kokusuna benzer koku bulunur. Hastalar, vücut direnci azaldığı için enfeksiyonlara hassastır.

Korunma:

Buzağı ve malaklar 3 - 6 haftalık iken ilaçlanmalıdır. Bu sayede bağırsaklardaki erişkin parazitler ortadan kaldırılabılır.

Tedavi:

Veteriner Hekime danışılmalıdır.



Bağırsaklardaki erişkin askaritler